



Măsuri recomandate

LA NIVELUL UNITĂȚILOR SANITARE

- 1.** Realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personal, cu recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor cu simptome respiratorii
- 2.** Purtarea echipamentului de protecție (măști, mănuși, halate) de către personalul medical și alte persoane care intră în contact cu pacienții
- 3.** Adaptarea programului de vizită al apărținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice, pe baza analizei de risc efectuate de către DSP
- 4.** Asigurarea stocurilor de antivirale, în special de către spitalele care internează cazuri de infecții respiratorii acute
- 5.** Instituirea terapiei antivirale specifice imediat după internare la pacienții care prezintă simptome specifice gripei
- 6.** Continuarea vaccinării antigripale a personalului medico-sanitar și auxiliar
- 7.** Refacerea, după caz, a stocurilor de echipamente de protecție, antiseptice și dezinfecțante
- 8.** Respectarea protocolelor de management al cazului de gripă, al contactilor și al focarelor de îmbolnăvire



Măsuri recomandate

LA NIVELUL POPULAȚIEI GENERALE

- 1.** Evitarea aglomerațiilor, aerisirea spațiilor închise și purtarea măștii de protecție
- 2.** Menținerea unei igiene adecvate a mâinilor, în vederea reducerii răspândirii virusului
- 3.** Respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de batiste de unică folosință
- 4.** Consultarea medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii, pentru a stabili indicațiile terapeutice, izolare la domiciliu și eventuale investigații suplimentare
- 5.** Consultarea centrelor de evaluare sau a centrelor de permanență organizate la nivel județean
- 6.** Continuarea vaccinării antigripale, în special pentru persoanele aflate la risc: persoane cu vîrstă peste 65 ani, gravide, boalaivil cronici



Măsuri recomandate

LA NIVELUL ANGAJATORILOR

- 1** Evitarea aglomerărilor în spațiile de lucru, acolo unde este posibil
- 2** Utilizarea măștii de protecție, dacă aglomerația nu poate fi evitată
- 3** Încurajarea vaccinării antigripale a personalului
- 4** Realizarea unui triaj epidemiologic zilnic și recomandarea de izolare voluntară la domiciliu a celor depistați cu simptomatologie respiratorie